

Министерство здравоохранения Свердловской области
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России
МАУ ГКБ №40 г.Екатеринбурга

Утверждено на заседании

Ученого Совета УГМУ

(протокол №8 от 15.05.2020)



**О применении препарата *Триазавирин* для лечения и
постэкспозиционной профилактики новой коронавирусной инфекции –
COVID-19**

Временные методические рекомендации

Екатеринбург, 2020

С учетом вышеизложенного рекомендуется следующая схема **постконтактной (постэкспозиционной) профилактики** новой коронавирусной инфекции COVID-19:

1. Для медицинских работников, оказывающих помощь больным с новой коронавирусной инфекцией – по 1 капсуле (250 мг) в день на весь период работы с больными. Контроль побочных реакций: общий ан. крови, печеночные пробы 1 раз в 2 недели.
2. Для постэкспозиционной профилактики в очаге (семейный, в учреждении закрытого типа) COVID-19 – контактными 1 порядка, **исключая** возраст до 18 лет и беременных, по 1 капсуле 3 раза (250 мг) в день в течение 7 дней

Схемы применения триазавирина в лечении больных COVID-19 у взрослых

1. Легкие (субклинические) формы болезни. При отсутствии коморбидной патологии и возрасте до 60 лет можно использовать препарат в виде монотерапии – по 1 капсуле (250 мг) 3 раза в день. Курс лечения не менее 10 дней.
2. Среднетяжелые формы. Можно использовать в составе комплексной этиотропной терапии в сочетании с препаратами, указанными во Временных методических рекомендациях Минздрава России (6 версия). Схема – по 1 капсуле (250 мг) 4 раза в день в течение 10 дней.
3. Тяжелые формы. Можно использовать в составе комплексной этиотропной терапии в сочетании с препаратами, указанными во Временных методических рекомендациях Минздрава России (6 версия). Схема – по 1 капсуле (250 мг) 5 раз в день в течение 10 дней.